


I - النسب المثلثية لزاوية حادة :

(1) - تعاريف :

A مثلث قائم الزاوية في A



(أ) -- جيب تمام زاوية حادة :


النسبة $\frac{AB}{BC}$ تسمى جيب تمام الزاوية $\hat{A}BC$.

يرمز لها بالرمز $\cos A\hat{B}C$ و نقرأ

و نكتب : $\cos A\hat{B}C = \frac{AB}{BC}$

أي $\cos A\hat{B}C = \frac{\text{طول المصنع المحادي لـ } \hat{A}BC}{\text{طول الوتر}}$

A مثلث قائم الزاوية في A



(ب) -- جيب زاوية حادة :


النسبة $\frac{AC}{BC}$ تسمى جيب الزاوية $\hat{A}BC$.

يرمز لها بالرمز $\sin A\hat{B}C$ و نقرأ

و نكتب : $\sin A\hat{B}C = \frac{AC}{BC}$

أي $\sin A\hat{B}C = \frac{\text{طول المصنع المقابل لـ } \hat{A}BC}{\text{طول الوتر}}$

A مثلث قائم الزاوية في A



(ج) -- ظل زاوية حادة :


النسبة $\frac{AC}{AB}$ تسمى ظل الزاوية $\hat{A}BC$.

يرمز لها بالرمز $\tan A\hat{B}C$ و نقرأ

و نكتب : $\tan A\hat{B}C = \frac{AC}{AB}$

أي $\tan A\hat{B}C = \frac{\text{طول المصنع المقابل لـ } \hat{A}BC}{\text{طول المصنع المحادي لـ } \hat{A}BC}$

(2) - مثال :



Mثلث قائم الزاوية في A بحيث :
 $AC = 4 \text{ cm}$ و $AB = 3 \text{ cm}$ و $BC = 5 \text{ cm}$
 لحسب النسب المثلثية للزاوية $\hat{A}CB$.

: حساب --- (أ)

: لدينا

$$\cos A\hat{C}B = \frac{AC}{BC}$$

: إذن

$$\cos A\hat{C}B = \frac{4}{5}$$

: حساب --- (ب)

: لدينا

$$\sin A\hat{C}B = \frac{AB}{BC}$$

: إذن

$$\sin A\hat{C}B = \frac{3}{5}$$

: حساب --- (ج)

: لدينا

$$\tan A\hat{C}B = \frac{AB}{AC}$$

: إذن

$$\tan A\hat{C}B = \frac{3}{4}$$

II - خصائص :

(1) - الخاصية الأولى :

مهما كان α قياس زاوية حادة $(0^\circ < \alpha < 90^\circ)$

فإن : $0 < \sin \alpha < 1$ و $0 < \cos \alpha < 1$

(2) - الخاصية الثانية :

مهما كان α قياس زاوية حادة $(0^\circ < \alpha < 90^\circ)$

$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$ فإن :

(3) - الخاصية الثالثة :

مهما كان α قياس زاوية حادة $(0^\circ < \alpha < 90^\circ)$

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \quad \text{فإن :}$$

(4) - الخاصية الرابعة : النسب المثلثية لزوايا ملائمة .

$\alpha + \beta = 90^\circ$ و α و β قياسي زاويتين حادتين بحيث :

$$\cos \alpha = \sin \beta$$

$$\sin \alpha = \cos \beta$$

$$\tan \alpha = \frac{1}{\tan \beta}$$

(5) - النسب المثلثية لزوايا خاصة :

α	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	غير معروف

تطبيقات :

. $\cos \alpha = \frac{2}{3}$ قياس زاوية حادة غير منعدمة بحيث :

(أ) --- لنحسب $\sin \alpha$:

. $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$ نعلم أن :

إذن :

$$\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha$$

$$= 1 - \left(\frac{2}{3} \right)^2$$

$$= 1 - \frac{4}{9}$$

$$= \frac{9 - 4}{9}$$

$$= \frac{5}{9}$$

و بما أن $0 < \sin \alpha < 1$: فإن

$$\sin \alpha = \sqrt{\frac{5}{9}}$$

$$\boxed{\sin \alpha = \frac{\sqrt{5}}{3}}$$

(ب) --- لحسب $\tan \alpha$

. $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$: نعلم أن

إذن :

$$\tan \alpha = \frac{\frac{\sqrt{5}}{3}}{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{5}}{2} \times \frac{3}{2}$$

$$\boxed{\tan \alpha = \frac{\sqrt{5}}{2}}$$

(ج) --- لحسب $\sin(90^\circ - \alpha)$

لدينا :

$$\begin{aligned}\alpha + (90^\circ - \alpha) &= \alpha + 90^\circ - \alpha \\ &= 90^\circ + \alpha - \alpha \\ &= 90^\circ\end{aligned}$$

إذن : α و $(90^\circ - \alpha)$ قياساً زاويتين متكاملتين .

و منه فإن $\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$:

$$\boxed{\sin(90^\circ - \alpha) = \frac{2}{3}} \quad \text{فإن} \quad \cos \alpha = \frac{2}{3} \quad \text{و بما أن}$$